

CLEF DU SOUS-GROUPE 5 C: PIED RUGUEUX, CHAIR CHANGEANT DE COUCHEUR.

5 C Chapeau
lisse, chair chan-
geant de couleur
vers le rouge, le
brun ou le bleu.

Voir aussi 1.4 *Leccinum
holopus*, Bolet tout en pied
du groupe 1:
CRITÈRE UNIQUE

Chapeau brun noirâtre,
chair changeant de
couleur vers le rouge.

Chapeau gris à brunâtre
pâle; chair changeant
vers le brun rougeâtre,
bleuâtre dans le pied.

Chapeau brun foncé à
noir; chair se teintant de
rosâtre puis de brun.

Chapeau blanc terne à
chamois pâle; chair
changeant de couleur
vers le bistre.

Chapeau blanchâtre,
jaunâtre ou brunâtre;
chair changeant de
couleur vers le bleu.

Chapeau blanchâtre,
jaunâtre ou brunâtre.

				5.12 Bolet de Snell <i>Leccinum snellii</i>
				5.13 Bolet du bouleau gris <i>Leccinum rimulosum</i>
				5.14 Bolet noir <i>Leccinum melaneum</i>
				5.15 Bolet insolite v. brune <i>Leccinum insolens</i> var. <i>bruneoma- culatum</i>
				5.16 Bolet à pied jaune <i>Leccinum flavostipitatum</i>
Chapeau brun orangé à jaune orange devenant cannelle pâle avec l'âge.	Rugosités du pied blanches au début devenant noirâtres à maturité.	Surface des tubes blanche devenant brun olive pâle à maturité.	Chair blanche changeant vers le rose ou le brun orangé à la coupe.	5.17 Bolet discoloré <i>Leccinum discolor</i>

CLEF DU SOUS-GROUPE 5 C: PIED RUGUEUX, CHAIR CHANDEANT DE COULEUR.

5 C Chapeau lisse, chair changeant de couleur vers le rouge, le brun ou le bleu.

Voir aussi 1.4 *Leccinum holopus*, Bolet tout en pied du groupe 1: CRITÈRE UNIQUE

Chapeau brun noirâtre, chair changeant de couleur vers le rouge.


Chapeau gris à brunâtre pâle; chair changeant vers le brun rougeâtre, bleuâtre dans le pied.

Chapeau brun foncé à noir; chair se teintant de rosâtre puis de brun.

Chapeau blanc terne à chamois pâle; chair changeant de couleur vers le bistre.

Chapeau blanchâtre, jaunâtre ou brunâtre; chair changeant de couleur vers le bleu.

Chapeau blanchâtre, jaunâtre ou brunâtre.

À première vue, le bolet de Snell peut être confondu avec le bolet rugueux (5.5), mais sa chair change lentement vers le rouge à la coupe, par endroits ou à la grandeur. Son chapeau, dans diverses teintes de brun noirâtre, est parfois craquelé à maturité ou par la dessiccation. La surface blanchâtre des tubes brunit au froissement ou avec l'âge; les pores sont circulaires.	5.12 Bolet de Snell <i>Leccinum snellii</i>	 
Le chapeau de ce bolet de petite taille est gris en jeune âge pour devenir brunâtre à maturité. Sa chair blanchâtre devient brun ou brun rougeâtre à la coupe, tandis que la base du pied devient souvent bleu-vert. Le pied est orné de rugosités gris-brun sur fond blanchâtre. La surface des tubes brun rosâtre brunit au froissement; les pores sont petits et ronds, à parois épaisses.	5.13 Bolet du bouleau gris <i>Leccinum rimulosum</i>	 
Chapeau sombre au début puis brun foncé, presque noir. La chair se teinte souvent de rosâtre à la coupe puis de brun après 30 minutes ou plus, bleuissant souvent à la base du pied. La surface blanche des tubes brunit au froissement ou avec l'âge; les pores sont petits et ronds. Le pied va en s'élargissant vers le bas et est orné de rugosités grisâtres à noirâtres.	5.14 Bolet noir <i>Leccinum melaneum</i>	 
On le rencontre sous les peupliers ou les bouleaux. Le chapeau va de grisâtre à rosâtre pâle. La chair blanchâtre bleuit ou devient jaunâtre à la coupe. La surface blanche des tubes devient jaune-brun au froissement ou avec l'âge; ses pores sont petits et circulaires. Le pied s'élargit vers le bas; les rugosités blanches en jeune âge deviennent plus denses et brun foncé à maturité.	5.15 Bolet insolite v. brune <i>Leccinum insolens</i> var. <i>bruneomaculatum</i>	 
Au frais et à l'humidité la chair bleuit intensément et rapidement à la coupe, ce qui est exceptionnel pour un bolet à pied rugueux. Le chapeau est gris noirâtre ou brunâtre, parfois avec des teintes verdâtres. La surface des tubes va de blanchâtre à jaunâtre et devient plus foncé avec l'âge, brunissant au froissement. Le pied est égal ou s'élargit vers le bas.	5.16 Bolet à pied jaune <i>Leccinum flavostipitatum</i>	 
La chair devient orange ou brun orangé à la coupe. Le chapeau brun orangé ou jaune-orange se décolore avec l'âge; la marge est appendiculée de tissus stériles. La surface blanche des tubes devient olivâtre à maturité; les pores sont grands et anguleux. Les rugosités du pied, blanches au début, deviennent brun foncé à maturité.	5.17 Bolet dis colore <i>L. discolor</i>	 

**SOUS-GROUPE 5 C: PIED RUGUEUX,
NOMS DES ESPÈCES**

**5 C Chapeau
lisse, chair chan-
geant de couleur
vers le rouge, le
brun ou le bleu.**

Chapeau brun noirâtre,
chair changeant de
couleur vers le rouge.

Chapeau gris à brunâtre
pâle; chair changeant
vers le brun rougeâtre,
bleuâtre dans le pied.

Chapeau brun foncé à
noir; chair se teintant de
rosâtre puis de brun.

Chapeau blanc terne à
chamois pâle; chair
changeant de couleur
vers le bistre.

Chapeau blanchâtre,
jaunâtre ou brunâtre;
chair changeant de
couleur vers le bleu.

Chapeau blanchâtre,
jaunâtre ou brunâtre.

Nom français: Bolet de Snell Nom anglais: Snell's Bolete Nom latin: <i>Leccinum Snellii</i> , <i>Krombhoziella snellii</i>	5.12 Bolet de Snell <i>Leccinum snellii</i>
Noms français: Bolet du bouleau gris, Bolet gercé Nom anglais: Nom latin: <i>Leccinum rimulosum</i>	5.13 Bolet du bouleau gris <i>Leccinum rimulosum</i>
Nom français: Bolet noir Nom anglais: Noms latins: <i>Leccinum melaneum</i> , <i>Leccinum scabrum</i> var. <i>melaneum</i>	5.14 Bolet noir <i>Leccinum melaneum</i>
Nom français: Bolet insolite var. bruneo-maculatum Nom anglais: Nom latin: <i>Leccinum insolens</i> var. <i>bruneo-maculatum</i>	5.15 Bolet insolite v. brune <i>Leccinum insolens</i> var. <i>Bruneo-maculatum</i>
Nom français: Bolet à pied jaune Nom anglais: Nom latin: <i>Leccinum flavostipitatum</i>	5.16 Bolet à pied jaune <i>Leccinum flavostipitatum</i>
Nom français: Bolet discolore Nom anglais: Nom latin: <i>Leccinum discolor</i>	5.17 Bolet discolore <i>Leccinum discolor</i>